

Załącznik nr 2 do decyzji MRiRW nr R - 242/2020d z dnia 07.04.2020 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-45/2018wu z dnia 19.09.2018r.

Posiadacz zezwolenia:

VIVAGRO, 5 allée Jacques Latrille 33650 Martillac, Republika Francuska, Tel. +33 05 57 78 32 68,
Fax. +33 05 57 29 38 35

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: (...)

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin: (...)


LIMOCIDE

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

olejek pomarańczowy (związek z grupy olejków eterycznych) – 60 g/l (6,0 %)

**Zezwolenie MRiRW nr R-45/2018wu z dnia 19.09.2018r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 242/2020d z dnia 07.04.2020 r.**

	
Uwaga	
H319 H332 H411	Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401	W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
P261 P280 P304 + P340	Unikać wdychania mgły/par. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305 + P351 + P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313	W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391	Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

INSEKTYCYD, AKARYCYD oraz FUNGICYD w formie mikroemulsji (ME) gotowej do użycia, o działaniu kontaktowym, przeznaczony do zwalczania szkodników o miękkiej budowie. Działanie grzybobójcze polega na wysuszeniu ścian komórkowych grzybni i zarodników.

Etykieta środka ochrony roślin Limocide, załącznik nr 2 do decyzji MRiRW

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

Jabłoń

Mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 28 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 12-59).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 7 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Skoczki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy, gdy pędy osiągną typową długość do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 40-59) oraz od końca fazy kwitnienia do fazy, gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 69-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 5 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Miodówki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 28 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 12-59) oraz od końca fazy kwitnienia do fazy, gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 69-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 7 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Ogórek (pod osłonami)

Mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 12-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 10 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Mączliki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 12-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 10 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Ogórek typu korniszon (pod osłonami)

Mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 12-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 5 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Mączliki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 12-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 5 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Cukinia (pod osłonami)

Mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy, gdy na poszczególnych pędach następuje rozwój owoców (BBCH 12-77).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 5 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Salata (pod osłonami)

Mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy widocznych pierwszych płatków kwiatów (BBCH 12-59).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 5 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 6.

Melon (pod osłonami)

Mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy, gdy na poszczególnych pędach następuje rozwój owoców (BBCH 12-77).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 10 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 6.

Pietruszka naciowa (pod osłonami)

Mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 18 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do końca fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatów, kwiaty nadal zamknięte (BBCH 12-59).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 3 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Truskawka (pod osłonami)

Mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy drugiego zbioru, większość owoców wybarwiona, zbiór późny (BBCH 12-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 5 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 6.

Róża (pod osłonami)

Mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 12-69).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 10 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 6.

Pomidor (pod osłonami)

Mączliki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 12-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 5 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 6.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Grusza, grusza azjatycka

Mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 28 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 12-59).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 7 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Skoczki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy, gdy pędy osiągną typową długość do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 40-59) oraz od fazy końca kwitnienia do fazy, gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 69-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 5 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Miodówki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 28 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 12-59) oraz od fazy końca kwitnienia do fazy, gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 69-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 7 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Brzoskwinia

Mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy rozwoju kwiatostanu do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 50-59) oraz od końca fazy kwitnienia do fazy, gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 69-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 10 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Marchew

Mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 24 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatów, kwiaty nadal zamknięte (BBCH 12-59).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 4 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Cykoria

Mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy widocznych pierwszych płatków kwiatów (BBCH 12-59).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 5 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Kapusta pekińska (w polu)

Bielik krzyżowych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy widocznych pierwszych płatków kwiatów (BBCH 12-59).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 4 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Kapusta głowiasta biała (w polu)

Bielik krzyżowych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy widocznych pierwszych płatków kwiatów (BBCH 12-59).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 4 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Mączliki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy widocznych pierwszych płatków kwiatów (BBCH 12-59) oraz od końca kwitnienia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 69-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 5 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Wciornastki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy widocznych pierwszych płatków kwiatów (BBCH 12-59) oraz od końca kwitnienia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 69-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 5 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Kapusta włoska

Mączliki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy widocznych pierwszych płatków kwiatów (BBCH 12-59) oraz od końca kwitnienia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 69-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 5 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Wciornastki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy widocznych pierwszych płatków kwiatów (BBCH 12-59) oraz od końca kwitnienia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 69-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 5 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Ogórek (w polu)

Mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 12-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 10 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Mączliki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 12-89).
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 10 l/100m².
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Ogórek typu korniszon (w polu)

Mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100m².
Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 12-89).
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 5 l/100m².
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Mączliki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 ml/100m².
Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 12-89).
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 5 l/100m².
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Cukinia (w polu)

Mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100m².
Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy, gdy na poszczególnych pędach następuje rozwój owoców (BBCH 12-77).
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 5 l/100m².
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Salata (w polu)

Mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 ml/100m².
Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy widocznych pierwszych płatków kwiatów (BBCH 12-59).
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 5 l/100m².
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Mączliki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 ml/100m².
Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 12-89).
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 5 l/100m².
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Salata (pod osłonami)

Mączliki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 12-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 5 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań środka w uprawie sałaty pod osłonami wymienionych we wcześniejszej części etykiety): 6.

Malina

Mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 24 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 12-59) oraz od końca fazy kwitnienia do fazy, gdy wytworzonych jest 70% owoców (BBCH 69-77).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 3 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 6.

Przędziorki, szpeciele

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy, gdy pędy osiągną 90% typowej długości do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 40-59) oraz od końca fazy kwitnienia do fazy początku opadania owoców (BBCH 69-89)

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 2 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 2.

Skoczki, miodówki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 24 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy, gdy pędy osiągną 90% typowej długości do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 40-59) oraz od końca fazy kwitnienia do fazy początku opadania owoców (BBCH 69-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 3 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 6.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6

Melon (w polu)

Mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy, gdy na poszczególnych pędach następuje rozwój owoców (BBCH 12-77).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 10 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Mączliki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 12-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 5 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Wciornastki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do końca fazy rozwoju pędów bocznych (BBCH 12-49).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 10 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Melon (pod osłonami)

Mączliki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 12-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 5 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Wciornastki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do końca fazy rozwoju pędów bocznych (BBCH 12-49).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 10 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań środka w uprawie melona wymienionych we wcześniejszej części etykiety): 6.

Rzepa

Mączniak rzekomy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 32 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy całkowitego rozwoju; korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 12-49).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 8 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Pietruszka naciowa (w polu)

Mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 18 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatów, kwiaty nadal zamknięte (BBCH 12-59).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 3 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Czarna porzeczka

amerykański mączniak agrestu

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 24 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 12-59) oraz od końca fazy kwitnienia do fazy, gdy wytworzonych jest 70% owoców (BBCH 69-77).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 3 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 6.

przędziorek chmielowiec, szpeciele

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 12-59) oraz od fazy końca kwitnienia do fazy początku opadania owoców (BBCH 69-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 2 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 2.

Skoczki, miodówki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 24 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy, gdy pędy osiągają 90% typowej długości do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 40-59) oraz od fazy końca kwitnienia do końca fazy początku opadania owoców (BBCH 69-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 3 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 6.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Salsefia

Mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 12-59).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 5 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Truskawka (w polu)

Mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 12-59) oraz od końca fazy kwitnienia do fazy drugiego zbioru, większość owoców wybarwiona, zbiór późny (BBCH 69-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 5 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Szara pleśń

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od końca fazy kwitnienia do fazy drugiego zbioru, większość owoców wybarwiona, zbiór późny (BBCH 69-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 5 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Wciornastki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 12-59).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 5 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Truskawka (pod osłonami)

Wciornastki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 12-59).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 5 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań środka w uprawie truskawki pod osłonami wymienionych we wcześniejszej części etykiety): 6.

Winorośl

Mączniak rzekomy winorośli, mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 16 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 12-57).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 2 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 6.

Skoczki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 16 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy, gdy liście są rozwinięte do fazy jagód dojrzałych do zbioru (BBCH 40-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 2 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 6.

Pilśniowiec winoroślowy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy, gdy liście są rozwinięte do fazy jagód dojrzałych do zbioru (BBCH 40-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 2 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 2.

Wciornastki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 16 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy dojrzewania jagód do zbioru (BBCH 12-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 2 l/100m².
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Liczba zabiegów: 6.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie winorośli: 6.

Estragon

Mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 ml/100m².
Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 12-59).
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 5 l/100m².
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Rośliny zielarskie (przeznaczone na napary)

Mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 ml/100m².
Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 12-59).
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 5 l/100m².
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Drzewa i krzewy ozdobne

Mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 ml/100m².
Termin stosowania środka: środek stosować od końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 12-59) oraz od fazy końca kwitnienia do fazy rozwoju owoców (BBCH 69-77).
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 10 l/100m².
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Skoczki, mszyce, miodówki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/100m².
Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy, gdy pędy osiągną typową długość (BBCH 12-49).
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 10 l/100m².
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Wciornastki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 64 ml/100m².
Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy, gdy pędy osiągną typową długość (BBCH 12-49).
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 8 l/100m².
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Kwiaty i rośliny ozdobne

Mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 12-59) oraz od fazy końca kwitnienia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 69-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 10 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 6.

Rdza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 12-59).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 10 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 3.

Mączliki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 12-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 10 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 6.

Wciornastki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 64 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy, gdy pędy osiągają typową długość (BBCH 12-49).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 8 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 6.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Róża (w polu)

Mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 12-59).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 10 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Mączliki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 12-59).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 10 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Wciornastki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 12-59).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 10 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Róża (pod osłonami)

Mączliki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 12-59).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 10 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Wciornastki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 12-59).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 10 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań środka w uprawie róży pod osłonami wymienionych we wcześniejszej części etykiety): 6.

Bób, fasola, groch, ciecierzycza, soczewica

Wciornastki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 12-59) oraz od fazy początku rozwoju strąków do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 71-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 5 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Cebula

Wciornastki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 32 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 12-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 4 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Por

Wciornastki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 64 ml/100m².

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy zakończenia wzrostu; gdy liście zamierają (BBCH 12-49).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 8 l/100m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Papryka (w polu i pod osłonami)

Mączliki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 ml/100m².
Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 12-89).
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 5 l/100m².
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Pomidor (w polu)

Mączliki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 ml/100m².
Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy pierwszy kwiatostan: otwarty pierwszy kwiat (BBCH 12-61).
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 5 l/100m².
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Wciornastki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100m².
Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy pierwszy kwiatostan: otwarty pierwszy kwiat (BBCH 12-61).
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 5 l/100m².
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Pomidor (pod osłonami)

Wciornastki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100m².
Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy pierwszy kwiatostan: otwarty pierwszy kwiat (BBCH 12-61).
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 5 l/100m².
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań środka w uprawie pomidora pod osłonami wymienionych we wcześniej części etykiety): 6.

Aktinidia (mini kiwi) (w polu)

Skoczki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/100m².
Termin stosowania środka: środek stosować od fazy osiągnięcia przez owoce 50% swojej wielkości do początku dojrzewania owoców (BBCH 75-81).
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 10 l/100m².
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Rośliny ozdobne – nie stosować w dniu zbioru

Pozostałe uprawy wskazane w etykiecie – 1 dzień

Uwaga:

- zaleca się stosować w początkowej fazie występowania chorób/szkodników na roślinie. Wówczas zaleca się aplikację w odstępach 7-10 dniowych,
- w przypadku małego nasilenia chorób/szkodników środek można stosować w odstępach 7-10 dniowych,
- w przypadku dużej presji szkodników/patogenów stosować na przemian z innymi środkami,
- biorąc pod uwagę różnorodność gatunków i odmian w uprawach roślin ozdobnych, przed zastosowaniem środka na dużych powierzchniach, zaleca się przetestowanie selektywności produktu na kilku roślinach tej samej odmiany i na tym samym etapie rozwoju,
- środek stosować w okresie bezdeszczowej pogody i braku rosy na roślinach,
- nie stosować na rośliny poddane stresowi wodnemu.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Stosować wraz ze środkiem zapobiegającym pienieniu.

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza ciecz mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

- jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin lub
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wyczyścić.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne (nitrylowe) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Stosować okulary ochronne.

Unikać wdychania mgły/par.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej poza obszar stosowania środka.

Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczoł.

W przypadku zastosowań w uprawach pod osłonami, nie należy stosować środka, gdy:

- znajdują się tam owady zapylające,
- wprowadzono pożyteczne owady.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
- w temperaturze 0°C - 20°C.

Chronić przed zamarzaniem

Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć i zużyć w ciągu 6 miesięcy.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -